

Ein Fall
von chronischer Ileocoecalinvagination mit
Prolapsus der Bauhin'schen Klappe.

(Mit einer Tafel.)


Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium
des
Herrn Professor Dr. O. Bollinger
der
medizinischen Fakultät zu München

vorgelegt von

D a n i e l R i t t e r
approbirtem Arzt.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



a Sonde in den Wurmfortsatz eingeführt.
b „ in das Lumen des Ileum eingeführt.

Ein Fall
von chronischer Ileocoecalinvagination mit
Prolapsus der Bauhin'schen Klappe.

(Mit einer Tafel.)

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des

Herrn Professor Dr. O. Bollinger

der

medizinischen Fakultät zu München

vorgelegt von

D a n i e l R i t t e r

approbirtem Arzt.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Wenn die Pathologie der Darminvaginationen noch heute sowohl bezüglich ihrer Genese als auch nach ihrer klinischen Seite hin ein wenig aufgeklärtes Feld bietet, so trägt daran nicht zum wenigsten unsere mangelhafte Kenntniss der physiologischen Darmbewegungen und die ungenügende Bekanntschaft mit den pathologischen Veränderungen dieser Bewegung bei Darmkrankheiten einerseits, anderseits der Umstand Schuld, dass die Invaginationen ihre klinischen Symptome mit einer Reihe anderer Darmkrankheiten gemeinsam haben und deshalb nur in den seltensten Fällen von diesen zu unterscheiden sind. Letzteres ist um so bedauerlicher, als ja der modernen Chirurgie so heilbringende Eingriffe zur Verfügung stehen und in der grossen Mehrzahl der Fälle nur von ihr sichere Hülfe zu erwarten ist.

In wie weit die Experimental-Pathologie es vermocht hat Licht in dieses Dunkel zu bringen, soll unten näher gewürdigt werden.

Bis gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts wurden die Darminvaginationen oder Intussusceptionen mit all' den Darmerkrankungen, die unter dem Erscheinungen der Stenose und des Ileus verliefen, unter den gemeinsamen Namen »Volvulus« zusammengefasst bis sie J. C. Peyer um jene

Zeit von diesem Allgemeinbegriffe trennte und ihnen einen selbstständigen Platz in der Reihe der Darmkrankheiten anwies.

Die Fragen nun, wie entstehen die Invaginationen, d. h. wie ist das Verhalten der beteiligten Darmabschnitte zueinander und welches sind die Gründe, die eine solche Einschiebung der einzelnen Darmstücke in einander verursachen? sind seit jener Zeit vielfach discutirt worden, doch hat keine der bisher aufgestellten Theorien alle dabei in Betracht kommenden Momente in genügender Weise zu erklären vermocht. Ja die Ansichten scheinen heute getheilter denn je, indem auf Grund angestellter Thierexperimente Momente, die fast allgemein als erwiesen galten, wieder angefochten werden.

Doch sind diese Thierexperimente vorerst noch zu unvollkommen, als daß ihnen eine wesentliche Bedeutung zuerkannt werden dürfte.

Es sei hier eine kurze Uebersicht der hauptsächlichsten Theorien, die zur Beantwortung beider Fragen seit jener Zeit aufgestellt worden sind, gestattet.

Dabei ist es nothwendig, zwischen agonalen und vitalen oder entzündlichen Invaginationen zu unterscheiden. Die plausibelste Ansicht von der Entstehung der ersteren ist die, daß in der Agone die einzelnen Darmabschnitte nicht gleichzeitig absterben, sondern während eine Darmstrecke schon vollständig gelähmt sei, befinde sich die oberhalb oder unterhalb von ihr liegende noch in regelmäßiger oder gar erhöhter Peristaltik und schiebe sich so in erstere hinein.¹⁾ Auf diese Weise ist das häufige Vorkommen

¹⁾ Eichhorst, Handbuch der spec. Path. und Ther. B. I. 1883.

mehrerer Invaginationen in derselben Leiche am besten erklärt. Eine andere Ansicht geht dahin, daß gegen das Lebensende besonders bei Krankheiten des Gehirns und des Darms eine sehr unregelmäßige Peristaltik auftrete, in Folge welcher sich einzelne Darmabschnitte in einander schieben.¹⁾

Dieser Erklärung steht eine dritte gegenüber,²⁾ die die Möglichkeit des Zustandekommens solch' unregelmäßiger Peristaltik auf das entschiedenste leugnet und ihrerseits die agonalen Invaginationen so entstehen läßt, daß in Folge von Aufblähung durch Gase der Darm sich erweitere und verlängere und so eigentlich aus einer gestreckten in eine gekrümmte Lage übergehen müsse; wenn nun für diese Krümmung und die dadurch nothwendig werdende seitliche Verschiebung kein Raum vorhanden sei, erfolge eine Verschiebung des Darms in seiner Längsaxe und so stülpe sich ein engeres Darmstück in ein weiteres.

Ein ungleich höheres Interesse nehmen im Gegensatze zu diesen agonalen die vitalen oder entzündlichen Invaginationen in Anspruch, so genannt weil sich bei ihnen in den meisten Fällen Entzündung und entzündliche Verklebung der die Invagination bildenden Cylinder findet. Doch ist auch ihre Aetiologie und Pathogenese noch vielfach Gegenstand der Controverse. Man unterscheidet je nach dem Darmabschnitte, an dem die Invagination ihren Sitz hat:

Ileum-Invaginationen, wenn Theile des Ileum sich ineinanderschieben;

¹⁾ Birch-Hirschfeld, Lehrb. der path. Anatomie.

²⁾ Engel, path. Anatomie. S. 567.

Ileocolon-Invaginationen, wenn das Ileum durch die Coecalklappe in das Colon gestülpt ist;

Ileocoecal-Invaginationen, wenn Ileum und Coecum in das Colon eingeschoben sind; ¹⁾

Colon-Invaginationen, wenn alle Cylinder aus Colon gebildet sind.

Wenn auch, wie oben erwähnt, in Bezug auf die Veränderungen der Darmbewegung bei pathologischen Processen dieses Organs noch ziemliche Unklarheit herrscht, so ist doch soviel bekannt, daß bei fast allen erhöhte Peristaltik auftritt.

Erhöhte Peristaltik spielt denn auch anerkannter Maassen bei der Entstehung der Intussusceptionen eine wesentliche Rolle. Dafür spricht zunächst der Umstand, daß fast alle entzündlichen Invaginationen absteigende, im Sinne der normalen Peristaltik sich bildende sind.

Die mehrfach in der Literatur bekannt gewordenen aufsteigenden Darmeinschiebungen sind als agonale zu betrachten, weil, wie Leichtenstern annimmt, zur Zeit ihrer Entstehung eine normale Peristaltik nicht mehr bestanden habe.²⁾

Doch lassen unter andern die von Jones³⁾ und F. Hildanus⁴⁾ beschriebenen Fälle keinen Zweifel mehr zu, daß

¹⁾ Hug. Leichtenstern, Prag. Vierteljahrsschrift 118. Bd. S. 193.

²⁾ v. Ziemsen, Path. und Ther. Bd. 7, 2. S. 498.

³⁾ Virchow-Hirsch, Jahresbericht Jhrg. 1878. S. 202.

⁴⁾ Weddern, de intussusceptionibus: »Crassa ipsa intestina in tenuia retrogredi posse, refert. F. Hildanus, qui coecum arcte contractum in ileum ingresum invenit, ita ut ileo fissio demum eximi posset.«

auffsteigende entzündliche Invaginationen, wenn auch als große Seltenheiten, vorkommen.¹⁾ Dieselben sind jedenfalls so zu erklären, dass auch während des Lebens der Darm sich vorübergehend in antiperistaltischer Bewegung befindet, ähnlich wie bei verschiedenen Darmkrankungen antiperistaltische Bewegung nachgewiesen ist.

Für den Einfluss erhöhter Peristaltik spricht ferner das oft rapide Wachsthum der Invaginationen²⁾ und das häufige Vorkommen derselben bei Anwesenheit von Fremdkörpern und polypösen Neubildungen, indem hier das Intusceptum, der Fremdkörper oder der Polyp mit großer Gewalt von der Peristaltik erfasst und in der Richtung nach dem Anus fortgezogen werden, wobei letztere die Darmwand, der sie anhaften, hinter sich herziehen.

Ob neben erhöhter Peristaltik aber Krampf oder Lähmung der Darmmuskulatur im Augenblicke der Invagination bestehe, darüber gehen die Ansichten sehr auseinander.

Die älteste Erklärung der Entstehung der Intusceptionen stammt von J. C. Peyer aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Dieser Autor nahm an, dass in Folge chronischer Krankheiten des Darmtractus oder auch in Folge eines Traumas, welches das Abdomen treffe, eine begrenzte Darmstrecke gelähmt werde. In diese gelähmte Darmstrecke nun stülpe sich die darunter liegende in lebhafter peristaltischer Bewegung sich

¹⁾ Prager Vierteljahresschrift 118. Bd. Nr. 210.

²⁾ v. Ziemsen, Path. und. Ther. Bd. 7, 2. S. 502.

befindliche so ein, daß jene die Scheide und den mittleren Cylinder, diese aber den innersten Cylinder bilde.¹⁾

Dieser Auffassung schloß sich Leichtenstern insoferne an, als auch er erhöhte Peristaltik und Lähmung der Muscularis für wesentliche ätiologische Momente erklärt:

»Die Parese einer begrenzten Darmstrecke und in Verbindung hiemit eine aus irgend welchen Gründen angeregte lebhafteste Peristaltik stellt für eine Reihe von Invaginationen die ausreichenden Bedingungen dar.«

Doch ist nach ihm das gegenseitige Verhalten der beteiligten Darmstücke insoferne ein anderes als das gelähmte Stück vor dem darüber liegenden in das unterhalb gelegene eingestülpt wird, letzteres also die Scheide, das gelähmte den mittleren und jenes den innersten aufsteigenden Cylinder darstellt.

Als Beweis hierfür führt Leichtenstern die bestehende Fixation des einmal eingeschobenen Intusceptums, sowie den Druck, der auf dieses und das zu ihm gehörige Mesenterium ausgeübt wird, an, welcher Druck sich durch Entzündung, blutige Infiltration und häufig durch Nekrose äußere und der nur durch eine nicht gelähmte Scheide erklärt werden könne.²⁾

Dieser Lähmungstheorie steht eine andere gegenüber, die behauptet, daß durch pathologische Einflüsse, wie lang andauernde Diarrhoe, partielle Peritonitis oder ein Trauma nicht Lähmung, sondern Krampf einer begrenzten Darmstrecke

¹⁾ v. Ziemssen, Path. und Ther., Bd. 7. 2. S. 501.

²⁾ v. Ziemssen, Path. und Ther., Bd. 7. 2. S. 502 ff.

erzeugt werde; das krampfhaft contrahirte Darmstück soll dann gleich einem Fremdkörper von dem oberhalb liegenden peristaltisch thätigen in das unterhalb liegende eingeschoben werden.¹⁾

Im Gegensatze zu jenen den *invaginationes paralyticae* würden diese *invaginationes spasmodicae* genannt.

Von Thierexperimenten auf diesem Gebiete ist aus früheren Zeiten nichts bekannt.

Erst im Jahre 1880 wurden zur Prüfung beider Ansichten, ob Lähmung oder Krampf, von Leubuscher Versuche an Kaninchen in folgender Weise angestellt:²⁾

Bei 12 Versuchsthieren wurde eine Darmstrecke von $1\frac{1}{2}$ —2 Ctm. Länge mit Pincetten so lange gequetscht, bis sie auf äußere Reize nicht mehr reagirten, in 2 von diesen Fällen zur künstlichen Erhöhung der Peristaltik noch 2 Tropfen Crotonöl in den gefüllten Magen gebracht. 24—72 Stunden nach der Operation kamen die Thiere zur Sektion und es fand sich bei einem eine $1\frac{1}{2}$ Ctm. lange aufsteigende Invagination; in den übrigen Fällen war außer entzündlicher Schwellung der gereizten Parthie nichts Besonderes zu finden.

In 6 weiteren Fällen wurden zur Erzeugung von Paresie die im Mesenterium zum Darm verlaufenden Nerven durchschnitten, bei 2 Thieren fand sich je eine $1\frac{1}{2}$ Ctm. lange absteigende Invagination, die aber leicht gelöst werden konnten.

Auch zur Prüfung der Krampftheorie machte Leubuscher

¹⁾ Leichtenstern, v. Ziemss. Path. u. Ther. Bd. 7. 2. S. 503.

²⁾ Virchow Archiv Bd. 85 S. 83 ff.

Verfuche an Kaninchen.¹⁾ In derselben Weise wie oben wurde eine kurze Darmstrecke gequetscht, bis die Contractionsfähigkeit bedeutend herabgesetzt, doch nicht völlig aufgehoben war.

Er wählte zu diesem Versuch den unmittelbar an die Einmündungsstelle des Ileum grenzenden Theil des Coecum, weil er glaubte, bei den hier so günstigen anatomischen Verhältnissen am ehesten ein befriedigendes Resultat zu erzielen. Nun wurde der untere Theil des Ileum mit einem starken faradischen Strom gereizt; es traten zwar heftige peristaltische Bewegungen und auch ringförmige Contractionen auf, aber keine Invagination. In einem anderen Fall wurde ein 1½ Ctm. langes Darmstück bis zum vollständigen Erlöschen der Contractionsfähigkeit gequetscht und dann der Darm oberhalb und unterhalb mit demselben Strom gereizt; auch dieser Versuch blieb erfolglos.

Das Resultat der Leubuscher'schen Versuche ist somit ein vollständig negatives, indem die entstandenen Invaginationen als agonale zu betrachten sind, und auch Leubuscher selbst hält sie dafür. Die Frage aber, warum das Ergebniss ein so ungünstiges war, ist schwer zu beantworten.

Die Annahme, dass der thierische Darm vielleicht für das Zustandekommen von Invaginationen nicht so geeignet sei, ist durch die Beobachtungen Bollinger's, wonach Invaginationen bei Thieren nicht selten vorkommen, besonders beim Hund, bei der Katze, beim Schwein und beim Rind, selten beim Pferd, und es kann der Grund wohl in nichts

¹⁾ Virchow Archiv Bd. 85 S. 83 ff.

anderem als in der unvollkommenen Erfüllung der Bedingungen, unter denen gewöhnlich Invaginationen entstehen, gesucht werden.

Jedenfalls können Versuche mit so vollkommen negativem Resultat eine Beweiskraft nicht beanspruchen und wenn man dabei noch das häufige Vorkommen von entzündlichen Darmschiebungen nach Cholera, Typhus, bei vorhandenen tuberculösen Geschwüren (ohne Stenose) bei tuberculöser Peritonitis, oder unmittelbar nach einem Trauma bei bis dahin gefunden Individuen berücksichtigt, die man nur mit der Annahme der Lähmung einer Darmstrecke erklären kann, so kann man nicht umhin, den Schluss Leubuscher's, daß nach den obigen Versuchen die Lähmungstheorie nicht mehr haltbar, für ungerechtfertigt zu erklären.

Wenn ich nun in Folgendem einen kleinen Beitrag zur Casuistik der Darminvaginationen liefere, so geschieht dies einmal, weil ich glaube, daß durch eine möglichst große Statistik die Kenntniß dieser Krankheit am meisten gefördert wird, dann auch, weil der mir vorliegende Fall nach verschiedenen Seiten Interessantes und Seltenes bietet.

Die krankengeschichtlichen Notizen verdanke ich der Güte des Herrn Dr. Stieler, prakt. Arzt in München.

K r a n k e n g e s c h i c h t e :

Patientin N. N., 58 Jahre alt, leidet seit Frühjahr 1882 an Appetitlosigkeit, zeitweiligem Erbrechen und Diarrhoe.

Die im Mai vorgenommene Untersuchung ergibt: starker Meteorismus, im linken Hypochondrium beträchtliche Resistenz.

Wegen erblicher Anlage Verdacht auf Carcinom. Auch auf drastische Abführmittel nur Abgang fäculent gefärbter Flüssigkeit; kothige Ausleerungen sind auf keine Weise, auch nicht durch große Einläufe von Wasser in den Mastdarm zu erreichen. Zwischendurch auftretende peritonitische Reizerscheinungen, die bald wieder verschwinden.

Diagnose: Partielle Darmstenose durch Carcinom des nach links verlagerten Coecum.

Im November plötzlich auftretender Anfall acuter Peritonitis mit gleichzeitiger retentio urinae. Bald nachher prolapsus ani (?) anfangs klein und leicht reponibel, später immer größer werdend und nur in Narkose reponibel, stets wieder mehr oder weniger nach außen prolabirend. Von da ab dauert ein steter unfreiwilliger Abgang fäculenter Flüssigkeit; retentio urinae verschwunden. Die Resistenz im Abdomen wird immer breiter und umfangreicher. Die Untersuchung per vaginam ergibt dem Verlaufe des Mastdarms entsprechend eine wurstförmige weiche Geschwulst ohne Kothinhalt. Von da ab Verdacht auf Invagination des Darms.

Der lethale Ausgang erfolgte Ende Januar 1883 an heftiger acuter Peritonitis.

Die Section, $\frac{1}{4}$ Stunde vor dem Begräbnis, konnte nur unvollkommen gemacht werden; es wurde nur die Bauchhöhle geöffnet. Die rechte Bauchhöhle ist mit kothig gefärbter Flüssigkeit und reichlichen Kothbrocken angefüllt, außerdem befinden sich nur wenige Dünndarmschlingen in ihr. Der ganze Dünn- und Dickdarm ist nach links gezogen. Colon ascendens und transversum werden vergeblich gesucht. Das

Colon descendens steigt als unförmig dicker Wulst senkrecht zum Anus herab. Vor demselben in einer Länge von 20 Ctm. hängt der Anfangstheil des Dickdarms, an seiner Spitze das Coecum mit der Bauhin'schen Klappe und Wurmfortsatz (vid. Tafel.) Das Duodenum wird unterhalb des Pylorus abgebunden und der ganze Darm sammt Mesenterium aus der Leiche herausgenommen.

Das dem pathologischen Institute zu München übergebene und dafelbst aufbewahrte Präparat (Einlauf-Journal Nr. 38. 1883) zeigt ungefähr folgendes:

(Die genaue Beschreibung der topographischen Anordnung ist dadurch ziemlich erschwert, dafs in Folge der grofsen Eile bei der Herausnahme nicht mit der nöthigen Schonung verfahren werden konnte.¹⁾)

Der Beginn der Invagination liegt in der Höhe des untern Querstücks des Duodenum und dicht neben diesem. Das in seiner ganzen Länge aufgeschnittene Duodenum und Jejunum zeigen nichts Abnormes, ebenso nicht der Anfangstheil des Ileum. Das mittlere Drittel des Ileum ist fast um das Doppelte seines natürlichen Volumens erweitert, seine Wandungen erheblich verdickt und fein seröser Ueberzug mit fibrinösen Auflagerungen bedeckt. Der unterste Theil des Ileum ist in das Colon eingeschoben. Von dem aufsteigenden und queren Colon ist nichts zu sehen und das absteigende stellt eine unförmig dicke mehrfach circular gewulstete Masse dar, deren Circumferenz 18 cm beträgt. Den Schluss des Darmrohres

¹⁾ Die beigegebene Abbildung ist nachträglich mit Zuhilfenahme der gefälligen Mittheilungen der Herrn Dr. Stieler nach dem anatomischen Präparate ausgeführt worden.

bildet das Coecum mit der Coecalklappe und dem Wurmfortsatz.

Beim Aufschneiden dieser wurstförmigen Masse findet sich der äußere Cylinder aus dem Endtheil des Dickdarms (Rectum, S. Romanum und absteigendem Colon) gebildet; in diesem ein mittlerer Cylinder, ungefähr aus der oberen Hälfte des Dickdarms (Colon transversum und ascendens) bestehend und endlich im Innern das Endstück das Ileum, welches an der Coecalklappe in den mittleren Cylinder sich umstülpt.

Wir haben es sonach mit einer Darminvagination zu thun, dessen Scheide vom Endtheile des Dickdarms, dessen mittlerer Cylinder vom queren und aufsteigenden Colon und dessen innerster Cylinder vom Endtheile des Ileum gebildet ist; den Kopf bildet das Coecum. Es handelt sich also mit anderen Worten um eine Einstülpung des Endstücks des Ileum und des Coecum in das Colon in der Ausdehnung, daß die Bauhin'sche Klappe und das Coecum 20 Centimeter weit vom After entfernt nach außen vorgefallen sind. Nach Leichtenstern wird diese Invaginationsform ileocoecalis genannt.

Eine ausgedehnte Verwachsung der einzelnen Cylinder besteht nicht und es ist das ganze innerste Rohr von der Einstülpungsstelle an bequem für eine ziemlich dicke Sonde durchgängig.

Unter allen Invaginationen sind nach der Statistik Leichtenstern's die ileocoecalen die häufigsten.

Unter 479 entzündlichen Darmeinschiebungen fand er: ¹⁾

¹⁾ Prager Vierteljahrschrift, 118 Bd. S. 194.

212	also	44 %	Ileo. coecalinvasionen	
142	„	30 „	Ileum	„
86	„	18 „	Colon	„
39	„	8 „	Ileo. Colon	„

Diese unverhältnismässige Häufigkeit ist einerseits begründet durch die anatomischen Verhältnisse, die bei keinem andern Darmabschnitte so günstig sind für das Zustandekommen einer Einschiebung: die Differenz im Lumen des Ileum und Colon und die grosse Beweglichkeit des ersteren im Gegensatz zu der bedeutenden Fixation der letzteren, anderseits aber auch darin, dass das Ileum und zwar hauptsächlich der unterste Theil desselben der Lieblingsitz des chronischen Catarrhs ist. Dass das Kindesalter noch ganz besonders häufig von dieser Form der Invagination betroffen ist, erklärt sich leicht daraus, dass die oben erwähnten Verhältnisse am kindlichen Darm in noch viel höherem Grade ausgesprochen sind; besonders der chronische Catarrh mit heftigen Diarrhoen nach der Entwöhnung der Muttermilch und dem Ersatz derselben durch unzweckmässige Nahrungsmittel.

Damit stimmen denn auch die grossen Zahlen, die der 3. 4. und 5. Monat in der Mortalitätsstatistik der Invaginationen aufzuweisen hat, überein.

Von 131 Todesfällen im kindlichen Alter kommen:¹⁾

auf die ersten 2 $\frac{1}{2}$ Monate 1 Fall;

auf den 3. Monat 10 Fälle.

(auf den 4. 5. und 6. Monat 80 Fälle)

¹⁾ Prager Vierteljahrsschrift. 118 Bd. S. 191.

(von 6 $\frac{1}{2}$ bis 10. Monat 28 Fälle)

von 10 $\frac{1}{2}$ bis 12. Monat 12 Fälle.

Wenn nun auch die Ileocoecalinvasion an sich keine Seltenheit sind, so erreichen sie meistens doch nur eine Länge von einigen Zoll; dann und wann wird wohl auch ein Fall beobachtet, in dem der invaginierte Darm bei der Untersuchung per rectum mit dem untersuchenden Finger zu fühlen war!¹⁾ Fälle, wie der vorliegende, gehören aber zu den größten Seltenheiten.

Hutchinson²⁾ veröffentlicht einen solchen, in dem bei einem 2jährigen Mädchen im Laufe eines Monats aus einem anscheinend mäfsigen Prolaps des Anus eine Invagination sich gebildet hatte und wo der invaginierte Darm 2 Zoll aus dem Rectum prolabirt war.

Weddern³⁾ beschreibt eine Ileocoecalinvasion bei einem 11jährigen Knaben, bei der das prolabirte Stück eine Länge von 1 $\frac{1}{2}$ Zoll hatte. Die dieser Arbeit beigegebene Abbildung zeigt ein dem hier vorliegenden Falle ganz ähnliches Bild.

Die von Bötticher⁴⁾ und Marette⁵⁾ mitgetheilten Invaginationen, bei denen der Prolapsus 40 cm und 112 cm lang war, sind als Unica zu betrachten und ohne die Annahme ganz abnormer Zustände kaum erklärlich.

¹⁾ Weddern: »de intussusceptionibus« Gryphiae 1841. S. 34.

²⁾ Virchow-Hirsch Jahresberichte, Jhrg. 1874. Bd. II.

³⁾ Weddern: »de intussusceptionibus.« S. 26.

⁴⁾ Virchow-Hirsch Jahresbericht, Jhrg. 1870. Bd. II.

⁵⁾ Virchow-Hirsch Jahresbericht, Jhrg. 1872. Bd. II.

Eine zweite interessante und seltene Seite bietet der hier vorliegende Fall durch seinen Verlauf und seine lange Dauer.

Im Allgemeinen unterscheiden wir bei den entzündlichen Invaginationen den acuten und den chronischen Verlauf.

Derselbe ist abhängig von dem Grade der Verengerung des Lumens; ist dieses ganz verschlossen, so erfolgt der Tod in 3—6 Tagen an Shok, oder aber das Intusceptum stößt sich zu frühzeitig ab, es erfolgt Perforation und allgemeine Peritonitis; in diesem Falle tritt der tödtliche Ausgang bei Kindern zwischen dem 4. und 7. Tage, bei Erwachsenen in der zweiten Woche ein!¹⁾

Doch kommt mitunter auch Heilung zu Stande und zwar entweder durch spontane oder künstliche Reposition, durch manuelle Reposition in den Fällen, in denen die Intusussception per rectum zu erreichen ist, oder durch die Operation. Letztere ist neuerdings sehr empfohlen, bietet jedoch nur dann günstige Ausichten auf Erfolg, wenn sie frühzeitig, d. h. ehe es zu Peritonitis und Adhäsionen gekommen ist, gemacht wird. Ist dagegen die Verengerung nur eine theilweise, so wird der Verlauf ein chronischer und es kann sich die Krankheit Wochen ja in seltenen Fällen selbst Monate hinziehen. Der Ausgang in Heilung kommt auch hier vor und zwar durch Ablosung des Intusceptums. Nach den Beobachtungen Leichtenstern war der Ausgang bei 170 Fällen mit Ausstossung des Intusceptums:

in 61 Fällen also 41 % tödtlich,

¹⁾ v. Ziemssen Path. u. Ther. Bd. 7, 2. S. 506 ff.

in 88 Fällen also 59⁰/₁₀₀ vollständige Genesung,
in 21 Fällen blieb der Ausgang unbekannt.¹⁾

Bei Ileocecalinvaginationen ist der chronische Verlauf der gewöhnliche und haben wir es in vorliegendem Falle auch mit diesem zu thun. Dabei kann sich, wie gesagt, die Krankheit Wochen selbst Monate hinziehen. Von Worthington²⁾ und Davies³⁾ sind Ileocecalinvaginationen von 8 monatlicher von Leichtenstern sogar eine von 11 monatlicher Dauer beobachtet worden; letztere ist von den bis jetzt bekannt gewordenen die längste.⁴⁾

Im vorliegenden Falle begann die Erkrankung im März 1882 mit Appetitlosigkeit, Diarrhoe und zeitweiligem Erbrechen — den Symptomen des chronischen Magen- und Darmkatarrhs.

Der bei der ersten Untersuchung im Mai constatirte Befund läßt keinen Zweifel zu, daß die Invagination damals schon bestanden hat. Ob man wegen des vorübergehenden Verschwindens der peritonitischen Reizerscheinungen eine vorübergehende spontane Lösung der Invagination annehmen soll, scheint mir deshalb nicht ganz gerechtfertigt, weil in diesem Falle doch auch eine vorübergehende Permeabilität hätte eintreten müssen, und davon ist in der Krankengeschichte nichts erwähnt. Vielmehr scheint die Invagination sich stets langsam vergrößert zu haben und dieses langsame Wachsthum ist den Ileocecal-

1) Prager Vierteljahrsschrift. Jhrg. 1874. I. S. 26.

2) Prager Vierteljahrsschrift. Jhrg. 1874 I. S. 48 ff.

3) Prager Vierteljahrsschrift. Jhrg. 1874. I. S. 48.

4) Prager Vierteljahrsschrift. Jhrg. 1874. I. S. 48.

einfülpungen eigenthümlich — und war sie im November so tief getreten, daß der Tumor auf die Harnblase drückte und incontinentia urinae bewirkte; letztere verschwand, als die Invagination noch tiefer trat und bald darauf vor den Anus prolabirte. Der Tod erfolgte an acuter Peritonitis hervorgerufen durch die bei der Perforation in die Bauchhöhle entleerten Faeces Ende Januar 1883.

Der Ausgang in Perforation ist, wenn auch nicht der gewöhnliche, so doch bei Ileocoecalintussusceptionen häufiger, als bei den übrigen Formen. In der Mehrzahl der Fälle ist die Perforationsstelle dicht über dem Eintritt der Invagination, mitunter ist auch die Scheide perforirt.¹⁾ Wo im vorliegenden Falle der Durchbruch stattgefunden hat, läßt sich mit Bestimmtheit nicht mehr sagen. Oberhalb der Eintrittsstelle ist eine Perforationsstelle nicht zu finden, dagegen ist die Scheide in einer Länge von 15 cm eingerissen. Wenn hier die Ruptur stattgefunden, so ist die Oeffnung jedenfalls aus Versehen vergrößert worden, auch macht dann die Erklärung, wie die beträchtlichen Kothmassen in die Scheide gekommen sind, einige Schwierigkeiten, da doch keinerlei Communication mit dem eigentlichen Darmlumen bestand; die einzige Möglichkeit wäre die, daß die faeces noch aus der Zeit vor der Invagination herrührten, obwohl auch diese Erklärung besonders bei der großen Masse nicht recht plausibel klingt.

Wenn wir nun den Beginn der Invagination in den April v. J. verlegen, so beträgt die Dauer derselben 9—10 Monate, ist

¹ Prager Vierteljahrsschrift. Jhrg. 1874. I. S. 25.

somit nur von dem von Leichtenstern beschriebenen Falle an Länge der Dauer übertroffen.

Die Frage nach der Entstehungsurache dieser Intussusception kann bei einer bis dahin völlig gefunden Frau und bei dem Fehlen irgend eines anderen anamnестischen Momentes nur dahin beantwortet werden, dafs in Folge des chronischen Darmkatarrhs und der damit verbundenen Diarrhoe eine Lähmung des Ileum hervorgerufen und dafs in Folge dieser Lähmung nach dem oben beschriebenen Mechanismus das Ileum sammt Coecum in das Colon gestülpt worden ist.

Ueberhaupt scheint mir bis jetzt ein zwingender Grund für das Fallenlassen der Lähmungstheorie nicht erbracht zu sein.

Wenn man von den durch Lähmung der Darmmuskulatur bedingten Invaginationen die auf rein mechanischem Wege entstandenen trennt und zu letzteren die durch Polypen, Fremdkörper hervorgerufenen rechnet, so lassen sich alle Darmein-stülpungen, welche Entstehungsurache auch immer für sie angegeben und angenommen sein mögen, nach diesen beiden Theorien erklären. Der Einwand, dafs in vielen Fällen keine Krankheit vorhergehe, durch die man sich eine Lähmung entstanden denken könne, ist nicht stichhaltig; denn abgesehen von der Schwierigkeit der Anamnese, der Unzuverlässigkeit in den Angaben der Patienten und ihrer Angehörigen, kennen wir in gar vielen Fällen die Entstehungsurache nicht, ohne sie deshalb leugnen zu können und warum sollte man sich eine plötzliche Lähmung einer Darmstrecke nicht etwa durch plötzliche Störungen der localen Circulation durch Embolie und Thrombose erklären können?

Weit entfernt zu behaupten, daß durch vorliegende Abhandlung das Räthsel der Aetiologie und Pathogenese der Darmeinschiebungen gelöst sei, so glaube ich doch durch die Mittheilung dieses sowohl durch die Länge des prolabirten Darmstücks als durch die Länge, Dauer und die Schwierigkeit der Diagnose interessanten und seltenen Falles einen nicht werthlosen Beitrag zur Casuistik der Darminvaginationen geliefert zu haben.

Meinem hochverehrten Lehrer Herrn Professor Dr. Bollinger sei an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung bei dieser Arbeit und die Ueberlassung des Präparates der herzlichste Dank ausgesprochen. Auch Herrn Dr. Stieler sage ich für die bereitwilligste Mittheilung der Krankengeschichte und des Sectionsbefundes meinen besten Dank.

Erklärung der Tafel:

- 1) Endtheil des Dickdarms (Rectum, S. romanum und absteigendes Colon.),
Scheide.
 - 2) Anfangstheil des Dickdarms (aufsteigendes Colon) mittlerer Cylinder.
 - 3) Coecum
 - a) Sonde die in die Bauhin'sche Klappe,
 - b) Sonde die in den processus vermiformis eingeführt ist.
-

